

Профилактика сыпного тифа = профилактика педикулеза

- соблюдать правила личной гигиены – регулярно принимать душ, менять нательное и постельное белье
- не пользоваться чужой одеждой, полотенцами, расческами, заколками, наушниками, так как через эти предметы передаются вши
- проводить взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия, детей после возвращения с каникул
- проводить периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения
- избегать контакта с зараженными педикулезом людьми

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



Эпидемический сыпной тиф



Сыпной тиф

острое инфекционное заболевание с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, способное к массовому распространению

Возбудитель

бактерия *Rickettsia prowazekii*
(риккетсия Провачека)

Механизм передачи

трансмиссивный, реализуется через кровососущих насекомых

Переносчик инфекции

вошь платяная, реже вошь головная



В настоящее время
в России сыпной тиф
практически
ликвидирован

Как происходит заражение

при укусе вошью здорового человека риккетсии с испражнениями вши попадают на кожу. При расчесывании места укуса возбудитель проникает в кровь

Симптомы

- повышение температуры тела до 40°C и выше
- головная боль
- слабость
- сыпь
- изменение поведения в виде двигательного беспокойства, сменяющегося адинамией
- расстройство сна из-за ночных кошмаров
- галлюцинации



Рецидивный сыпной тиф или болезнь Брилла-Цинссера

Возникает после перенесенной первичной инфекции через месяцы или годы возможен рецидив сыпного тифа под воздействием различных факторов (стресс, переохлаждение и др.).

Клинически болезнь Брилла-Цинссера очень похожа на эпидемический сыпной тиф, только симптомы заболевания несколько слабее.

В случае вшивости болезнь Брилла-Цинссера может привести к заражению окружающих эпидемическим сыпным тифом.

