

"Вшивый" тиф

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЫПНОЙ ТИФ

"Военный" тиф



Сыпной тиф — острое
инфекционное заболевание с
трансмиссивным механизмом
передачи возбудителя,
способное к массовому
распространению





Возбудитель

Rickettsia prowazekii

Бактерия

Источник инфекции

человек, больной эпидемическим или рецидивным сыпным тифом

Механизм заражения
трансмиссивный

Необходимо
кровососущее
насекомое

Переносчик

вошь плотяная, реже вошь
головная






Как происходит заражение сыпным тифом?



Вши заражаются рикettsиями при кровососании больного человека



При укусе здорового человека рикettsии с испражнениями вши попадают на его кожу



При расчесывании места укуса возбудитель проникает в кровь





При
отсутствии
педикулеза

больной *НЕ опасен*
для окружающих

Вши



ФБУЗ "Центр гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора





Симптомы

- ✓ повышение температуры тела до 40°C и выше
- ✓ головная боль, слабость
- ✓ обильная сыпь на коже
- ✓ поражение нервной системы:
нарушение сна, ночные кошмары,
галлюцинации

Осложнения

коллапс, миокардит, разрывы сосудов
мозга, кишечные кровотечения





Болезнь Брилла-Цинссера

Рецидивный
сыпной тиф

Возникает у ранее
переболевших сыпным
тифом

Симптомы аналогичны
эпидемическому сыпному тифу

В случае вшивости может привести к
заражению окружающих
эпидемическим сыпным тифом





Профилактика заболевания

Борьба с
педикулезом



соблюдать правила личной гигиены:
регулярно принимать душ, менять
нательное и постельное белье



не пользоваться чужой одеждой,
полотенцами, расческами, заколками



проводить взаимные осмотры волос
и одежды у членов семьи, особенно
детей



избегать контакта с зараженными
педикулезом людьми



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Узнайте больше о профилактике инфекций
из материалов
ЦГОН Роспотребнадзора

Telegram



ВКонтакте



Сайт



RUTUBE



Одноклассники

