

Сибирская язва



Сибирская язва – **особо опасное** инфекционное заболевание, вызываемое бактериями ***Bacillus anthracis***.

Споры *B. anthracis* способны годами переживать неблагоприятные условия внешней среды, выдерживая высокие температуры, замораживание и действие дезинфицирующих средств.

Резервуар инфекции – почва территорий, неблагополучных по сибирской язве.

Источник инфекции – **чаще** сельскохозяйственные животные (козы, овцы, коровы, лошади, верблюды, ослы, олени), реже дикие животные .

Сибирская язва преимущественно передается:

- **контактным путем**
при прямом контакте с больными животными, их трупами, продуктами и сырьем животного происхождения
- **воздушно-пылевым путем**
при вдыхании пыли со спорами бактерий
- **алиментарным путем**
при употреблении мяса больного животного



Общие симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, слабость, боли в пояснице

При кожной форме: безболезненные язвы с черным дном (сибиреязвенный карбункул)

При легочной форме: кашель с кровью, одышка

При кишечной форме: боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул с кровью

Вакцинация против сибирской язви входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и проводится в плановом порядке лицам из групп риска (сельскохозяйственные работники, работники скотобоев, мясокомбинатов, животноводческих ферм, кожевенных заводов и другие)

Меры профилактики сибирской язви

- не покупать мясные продукты с рук и в непроверенных местах
- не приобретать шкуры, одежду и сувениры, изготовленные из кожи и шерсти неизвестного происхождения
- выполнять необходимые санитарно-гигиенические мероприятия на предприятиях, перерабатывающих продукты и сырье животноводства