





ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора

Коклюш





Коклюш

Это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, своеобразным судорожным приступообразным кашлем и циклическим затяжным течением.



ФБУЗ "Центр
гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора




Возбудитель

Бактерия *Bordetella pertussis*.

- Чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей, дезинфицирующих средств, высоких и низких температур.
- Погибает при высыхании в течение нескольких часов, при нагревании до + 50°C в течение 30 минут, при кипячении — моментально.

Малоустойчива во внешней среде.



ФБУЗ "Центр
гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора




Путь передачи

Инфекция распространяется воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании, крике и плаче.

Группа риска — дети до 1 года

Наиболее опасен коклюш для детей первого года жизни, у которых из-за развития осложнений заболевание может закончиться летально.





Симптомы

Течение типичной формы коклюша — цикличное и состоит из нескольких периодов. Симптомы появляются после контакта с заболевшим в среднем через 7–10 дней, но могут проявиться и позже, вплоть до 21 дня.

Катаральный период

Чихание, насморк, сухой кашель, незначительное повышение температуры тела.

Спазматический период

Главный симптом — сухой, навязчивый, приступообразный кашель, прерываемый свистящим судорожным вдохом (реприза).

Продолжительность приступа кашля может быть от нескольких секунд до нескольких минут, а их количество за сутки — 15-25.

Период выздоровления

Постепенно снижается частота приступов кашля.



Коклюш начинается как острая респираторная инфекция, но, в отличие от нее, может длиться неделями или месяцами



ФБУЗ "Центр
гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора



СИМПТОМЫ

У детей раннего младенческого возраста, подростков и взрослых коклюш может протекать атипично, без приступообразного кашля!

Младенцы



Симптомы: чихание, плач или крик.



Часто возникают опасные для жизни состояния, такие как остановка дыхания, судороги, нарушение сознания, кровоизлияния.

Подростки и взрослые



Протекает бессимптомно или в стертой форме.



Одна из частых причин хронического кашля у взрослых.

Старшие дети и родители становятся источником инфекции для младенцев, которые еще не получили свою первую противокклюшную прививку!




ФБУЗ "Центр
гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора



Специфическая профилактика

Самый действенный способ защиты от коклюша — вакцинация!



Иммунизация против коклюша проводится детям в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по схеме:

- 3 вакцинации – в 3 месяца, 4,5 месяца и 6 месяцев;
- однократная ревакцинация в 18 месяцев.

Вакцинация направлена на защиту детей, поддержание популяционного противокклюшного иммунитета, предупреждение тяжелых форм заболевания и летальных исходов у детей первого года жизни.



ФБУЗ "Центр
гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора



Неспецифическая профилактика

- В процессе кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой, платком или, при их отсутствии, сгибом локтя.
- Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком.
- При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью.
- По возможности не контактируйте с людьми с признаками инфекционного заболевания.
- Регулярно проветривайте помещение и проводите влажную уборку.



ФБУЗ "Центр
гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора

Присоединяйтесь!

ВсемСанПросвет



ВКонтакте



RUTUBE



Telegram



<https://cgon.rospotrebnadzor.ru/>

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 555 49 43