

Меры профилактики

- борьба с грызунами – источниками возбудителя;
- борьба с клещами, комарами, слепнями – переносчиками возбудителя;
- хранение продуктов в местах, недоступных для грызунов, воды – в закрытых емкостях;
- отказ от употребления продуктов со следами жизнедеятельности грызунов;
- использование средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) при проведении "пыльных" сельскохозяйственных работ.

Населению, проживающему на неблагополучных по туляремии территориях, а также лицам, подвергающимся риску заражения этой инфекцией, проводится вакцинация против туляремии.

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиенического
образования населения»
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер.,
д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28



Туляремия



Туляремия

природно-очаговая инфекция, широко распространенная на территории России

Возбудитель

бактерия *Francisella tularensis*

обладает высокой патогенностью для человека: попадание 10-50 бактерий в организм приводит к развитию заболевания.

Грызуны – основной источник возбудителя инфекции.

Существование микроба в природных очагах поддерживается также иксодовыми клещами, комарами, слепнями.



Как происходит заражение

- при укусе человека инфицированными кровососущими насекомыми (комары, слепни), присасывании клещей;
- при соприкосновении с больными животными или их тушками;
- при употреблении продуктов питания и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов), контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов;
- при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов.

Установлено отсутствие передачи инфекции от человека к человеку.



Инкубационный период

в среднем 3-7 дней

Основные симптомы

- повышение температуры,
- головная боль,
- слабость,
- воспаление лимфоузлов и прилежащих к ним тканей (образование бубонов)

Своевременное начало лечения – залог благоприятного исхода заболевания!

