






ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



Иксодовый клещевой боррелиоз



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2024 году в России было
зарегистрировано

7118


случаев иксодового
клещевого боррелиоза
в 78 регионах страны

Иксодовый клещевой боррелиоз
ежегодно занимает

1 место

по распространенности и частоте
регистрации среди инфекций,
передаваемых клещами

КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ



Бактериальная
инфекция

характерно поражение кожи,
суставов, сердечно-сосудистой
и нервной систем




Возбудитель

бактерии рода *Borrelia*



Естественные
хозяева


дикие и сельскохозяйственные
животные: крупный рогатый скот,
овцы, собаки, птицы, грызуны, олени



Переносчики

клещи рода *Ixodes*


КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?



при присасывании клеща,
инфицированного возбудителем



трансплацентарно от больной
матери ребенку




при раздавливании клеща
и последующем механическом
переносе возбудителя на слизистые
оболочки или поврежденную кожу



при употреблении сырого
молока, прежде всего козьего,
и молочных продуктов без
термической обработки

КЛЕЩИ



Кровососущие
членистоногие

Они способны заразить человека
опасными заболеваниями



Места обитания

Преимущественно хвойно-лиственные
леса, парки и лесопарки, кладбища,
дачные участки



Где нападают

Клеши подстерегают жертву на траве
и низких кустарниках вдоль тропинок




Когда нападают

С ранней весны и до поздней осени,
пик численности и активности клещей
приходится на май-июнь


Особенности присасывания клещей



клещ, попадая на тело человека, в течение 20-30 минут ищет подходящее место для кровососания



наиболее «привлекательны» для клещей места с тонкой кожей и обильным кровоснабжением (волосистая часть головы, шея, грудь, подмышечные впадины, паховые складки)



присасывание клеща часто остается незамеченным, так как в состав его слюны входят анестезирующие вещества




ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИСОСАЛСЯ КЛЕЩ?



**Клеща
немедленно удалить**

Чем быстрее удалить клеща, тем меньше опасных возбудителей попадет в кровь!




**Сдать
клеща на анализ**

Поместить клеща в прозрачную плотно закрывающуюся емкость и доставить в лабораторию как можно быстрее



**Обработать ранку
антисептиком**

После снятия клеща место присасывания необходимо обработать йодом, спиртом или другим антисептиком



**Обратиться
к врачу**

Если в клеще обнаружены возбудители инфекций, незамедлительно обратитесь к врачу

СИМПТОМЫ

**Инкубационный
период**

от 2 до 30 дней

повышение температуры тела

слабость и светобоязнь

боль в мышцах и суставах

тошнота, рвота


мигрирующая кольцевидная
эритема на месте присасывания
клеща

ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ



Благоприятное течение

При адекватной и рано начатой терапии длительность заболевания составляет от 3 дней до 1 месяца и заканчивается полным выздоровлением




Неблагоприятное течение

приводит к развитию осложнений — менингита, менингоэнцефалита, перикардита, миокардита, хронического Лайм-артрита, атрофического акродерматита и других состояний



Хроническое течение

развивается при поздней диагностике, несвоевременно проведенном или неполном курсе лечения, может быть непрерывным или рецидивирующим




Отдаленные последствия

стойкие патологические изменения нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и кожи, приводящие к ухудшению качества жизни и инвалидности




ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА — ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ

Собираясь на прогулку, в поход, на дачу или в лес, важно соблюдать меры профилактики присасывания клещей:



Правильно одеться

- надеть однотонную светлую одежду, закрытую обувь, головной убор или капюшон
- все элементы одежды (рукава, брюки и носки) должны плотно прилегать к телу и полностью его закрывать



Обработать одежду специальными средствами

- акарицидными
- репеллентными
- акарицидно-репеллентными

Использовать эти средства только в соответствии с инструкцией по применению




ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА — ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ



На прогулке




- проводить само- и взаимоосмотры каждые 15-20 минут
- ходить по тропам и избегать высокой травы и кустарников
- не сидеть на траве, использовать брезент или туристический коврик




После прогулки

- перед входом в жилище внимательно осмотреть одежду, снаряжение и домашних животных
- дома снять одежду и тщательно осмотреть тело, уделяя особое внимание волосистой части головы, коже за ушами, пупку, подмышечным впадинам и паховой области

ВСЕМСАНПРОСВЕТ





**Берегите себя
и будьте здоровы!**

