Менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция – опасная для жизни, часто молниеносная инфекция, вызываемая менингококком (*Neisseria meningitidis*).
Источник инфекции – больной человек или носитель.
Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем при тесном контакте, когда расстояние между людьми составляет менее 1 метра.

Менингококк неустойчив во внешней среде, быстро погибает при перепадах температуры и влажности, воздействии ультрафиолета и дезинфицирующих средств.



Симптомы зависят от формы инфекции:

- **менингококковый назофарингит:**

лихорадка, слабость, головная боль, насморк,

- **менингококковый сепсис:**

лихорадка, головная боль, бледность кожи, рвота, сыпь на коже, похожая на кровоизлияния,

- **менингококковый менингит:**

сильнейшая головная боль, тошнота, повторная рвота, светобоязнь, напряженность мышц шеи.

Осложнения менингококковой инфекции очень тяжелые: судороги, снижение слуха или глухота, парезы или ампутации конечностей.

Летальность при септической форме болезни составляет 15%, а у детей до года и лиц старше 65 лет - более 30%, инвалидизация наступает в 10-15% случаев.

Самая надежная защита от менингококковой инфекции – вакцинация!

Вакцинация против менингококковой инфекции проводится в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок.

Схема вакцинации:
Детям с 9 до 23 месяцев – 2 введения вакцины с интервалом не менее 3 месяцев.
Детям с 2-х лет и взрослым – 1 введение.

cgon.rospotrebnadzor.ru