
Дифтерия

Это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсигенными коринебактериями дифтерии, характеризующееся воспалительными изменениями слизистых оболочек или кожи с образованием местного фибринозного воспаления и токсическим поражением сердца, нервной системы и почек.

Источник инфекции — больной человек или бессимптомный носитель.

Симптомы: повышение температуры тела, слабость, головная боль, боль в горле, образование дифтерийных пленок на миндалинах, задней стенке глотки, небном язычке.

Дифтерийные пленки
Налеты сероватого цвета, плотно спаянные с окружающими тканями. Попытки их удалить вызывают кровотечение. Их наличие может затруднять дыхание и глотание, а также вызывать характерный лающий кашель



Дифтерия передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями в следующих случаях:

- при взаимодействии с заболевшим, который выделяет бактерию с капельками слюны при разговоре, кашле и чихании
- через руки, игрушки, белье, предметы обихода, на которых присутствует возбудитель

Вакцинация — лучшая защита от дифтерии!
Проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок



Три вакцинации детей:
V1 — 3 месяца
V2 — 4,5 месяца
V3 — 6 месяцев

Три ревакцинации детей:
RV1 — 18 месяцев
RV2 — 6-7 лет
RV3 — 14 лет

Ревакцинация взрослых:
каждые 10 лет с момента проведения последней прививки, без ограничения по возрасту

Иммунитет после вакцинации или перенесенного заболевания со временем ослабевает и нуждается в поддержке: не пропускайте сроки ревакцинации!

Экстренная вакцинация в очаге дифтерии
Проводится непривитым и не имеющим сведений о прививках; лицам, у которых наступил срок очередной вакцинации или ревакцинации, а также тем, у кого не обнаружен защитный титр антител

cgon.rospotrebnadzor.ru