






ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



Клещевой вирусный энцефалит






ЦИФРЫ И ФАКТЫ


В 2025 году в России было
зарегистрировано

1807

случаев клещевого вирусного
энцефалита в 54 регионах страны



КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ



Вирусная
инфекция

характерно поражение
центральной нервной системы




Естественные
хозяева

крупный рогатый скот, козы, овцы,
собаки, птицы, грызуны, олени



Возбудитель


вирус клещевого энцефалита



Переносчики

клещи рода *Ixodes*

ТЕРРИТОРИИ РИСКА



Эндемичные территории

Регионы, где стабильно регистрируются устойчивые очаги вируса клещевого энцефалита и в связи с этим существует повышенный риск заражения людей



В Российской Федерации

49 субъектов эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту



Список эндемичных территорий

регулярно обновляется и публикуется на сайте Роспотребнадзора






ТЕРРИТОРИИ РИСКА

Территории, где в 2025 году было зарегистрировано наибольшее количество случаев клещевого вирусного энцефалита по данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году»



КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?



при присасывании клеща,
инфицированного возбудителем




при раздавливании клеща
и последующем механическом
переносе возбудителя на слизистые
оболочки или поврежденную кожу



при употреблении сырого
молока, прежде всего козьего,
и молочных продуктов без
термической обработки

КЛЕЩИ



Кровососущие
членистоногие

Они способны заразить человека
опасными заболеваниями



Места обитания

Преимущественно хвойно-лиственные
леса, парки и лесопарки, кладбища,
дачные участки



Где нападают

Клеши подстерегают жертву на траве
и низких кустарниках вдоль тропинок




Когда нападают

С ранней весны и до поздней осени,
пик численности и активности клещей
приходится на май-июнь


Особенности присасывания клещей



клещ, попадая на тело человека, в течение 20-30 минут ищет подходящее место для кровососания



наиболее «привлекательны» для клещей места с тонкой кожей и обильным кровоснабжением (волосистая часть головы, шея, грудь, подмышечные впадины, паховые складки)



присасывание клеща часто остается незамеченным, так как в состав его слюны входят анестезирующие вещества




ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИСОСАЛСЯ КЛЕЩ?



**Клеща
немедленно удалить**

Чем быстрее удалить клеща, тем меньше опасных возбудителей попадет в кровь!




**Сдать
клеща на анализ**

Поместить клеща в прозрачную плотно закрывающуюся емкость и доставить в лабораторию как можно быстрее



**Обработать ранку
антисептиком**

После снятия клеща место присасывания необходимо обработать йодом, спиртом или другим антисептиком



**Обратиться
к врачу**

Если в клеще обнаружены возбудители инфекций, незамедлительно обратитесь к врачу




ЭКСТРЕННАЯ СЕРОПРОФИЛАКТИКА

Проводится в случае обнаружения в клеще возбудителей
клещевого вирусного энцефалита




Кому?

Не привитым против клещевого
вирусного энцефалита или получившим
неполный курс вакцинации, отметившим
присасывание клещей на эндемичных
территориях



Как?

Вводится иммуноглобулин
человека против клещевого
вирусного энцефалита



Когда?

В максимально ранние сроки,
но не позднее 4-х суток после
присасывания клеща

СИМПТОМЫ

**Инкубационный
период**

от 2 до 25 дней

повышение температуры тела

сильная головная боль

боль в мышцах и суставах

тошнота, рвота

ригидность мышц шеи

спутанность сознания

судороги, парезы и параличи




ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ




Благоприятное течение

В большинстве случаев заболевание заканчивается полным выздоровлением




Неблагоприятное течение

приводит к развитию осложнений — вялых параличей верхних конечностей, эпилепсии, снижению интеллекта и другим неврологическим расстройствам



Отдаленные последствия

возможны инвалидизация в результате парезов и атрофии мышц, хронизация процесса по типу медленной инфекции



Летальность

в различных регионах составляет от 5 до 30%



ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

самая эффективная мера профилактики

Стандартная схема

V 1 — в выбранный день
V 2 — через 1-7 месяцев
RV — через 12 месяцев
далее RV — каждые 3-5 лет

Идеальное время для вакцинации против вирусного клещевого энцефалита — осенне-весенний период (ноябрь – март)

Ускоренная схема


V 1 — в выбранный день
V 2 — через 14 дней
RV — через 12 месяцев
далее RV — каждые 3-5 лет

Проводится при необходимости быстрого приобретения иммунитета к клещевому энцефалиту, например, перед поездкой в эндемичную зону




НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Собираясь на прогулку, в поход, на дачу или в лес, важно соблюдать меры профилактики присасывания клещей:



Правильно одеться

- надеть однотонную светлую одежду, закрытую обувь, головной убор или капюшон
- все элементы одежды (рукава, брюки и носки) должны плотно прилегать к телу и полностью его закрывать



Обработать одежду специальными средствами

- акарицидными
- репеллентными
- акарицидно-репеллентными

Использовать эти средства только в соответствии с инструкцией по применению




НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА



На прогулке

- проводить само- и взаимоосмотры каждые 15-20 минут
- ходить по тропам и избегать высокой травы и кустарников
- не сидеть на траве, использовать брезент или туристический коврик



После прогулки

- перед входом в жилище внимательно осмотреть одежду, снаряжение и домашних животных
- дома снять одежду и тщательно осмотреть тело, уделяя особое внимание волосистой части головы, коже за ушами, пупку, подмышечным впадинам и паховой области


ВСЕМСАНПРОСВЕТ




Telegram




Вконтакте




Макс



Rutube





**Берегите себя
и будьте здоровы!**

