

Меры профилактики

- Тщательное мытье рук перед едой, после посещения туалета.
- Регулярное проведение влажной уборки помещений, смена постельных принадлежностей, белья, полотенца.
- Содержание в идеальной чистоте сантехники, детских горшков, предметов обихода, игрушек, дверных ручек и т. д.
- Защита помещений от мух и тараканов.
- Приобщение детей с раннего возраста к правилам личной гигиены (мытье рук после посещения туалета и перед едой, избавление от привычки грызть ногти, регулярное мытье тела, содержание одежды в чистоте и т.д.).



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



Гименолепидоз



Гименолепидоз

гельминтоз человека, вызываемый паразитированием *Hymenolepis nana* (карликового цепня), с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя.

Распространенность

Гименолепидоз распространен повсеместно. Чаще регистрируется в регионах с сухим и жарким климатом.

Наличие случаев гименолепидоза в семье или коллективе – признак грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического режима, который свидетельствует о свежем фекальном загрязнении окружающих объектов и рук людей.



Источник инвазии – больной человек

- Механизм передачи – фекально-оральный.
- Заражение здорового человека происходит при заглатывании яиц гельминтов.

Кто болеет чаще?

Дети 3-9 лет.

Грязные руки – ведущий фактор передачи возбудителя гименолепидоза.

Другими факторами передачи могут быть предметы обихода, игрушки, продукты питания, почва, вода.

Роль механического переносчика могут играть мухи и тараканы.



Инкубационный период

около двух недель

Основные симптомы:

снижение аппетита, боли в животе, головная боль, тошнота, потеря массы тела; возможны аллергические проявления.

Примерно в 30% случаев гименолепидоз протекает бессимптомно.

Прогноз при гименолепидозе благоприятный. Лечение проводится специальными противогельминтными препаратами по назначению врача.

