


Профилактика:

- употребляйте только термически обработанные молоко и молочные продукты;
- приобретайте продукты только в местах санкционированной торговли;
- соблюдайте меры предосторожности при работе с сельскохозяйственными животными: используйте маску, перчатки и защитную одежду;
- после работы с сельскохозяйственными животными примите душ и переоденьтесь.



Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиенического
образования населения»
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер.,
д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28



Лихорадка Ку (коксииеллез)



Лихорадка Ку (кокциеллез)

Инфекционная болезнь, передающаяся человеку от животных, вызываемая бактерией *Coxiella burnetii*.

В сельскохозяйственных очагах основным источником инфекции является мелкий и крупный рогатый скот.

Чаще всего заражение людей происходит от сельскохозяйственных животных – пуховых коз, овец, крупного рогатого скота.

В природных очагах резервуаром возбудителя инфекции являются клещи, мелкие млекопитающие, птицы.



Как происходит заражение

- при вдыхании пыли, содержащей сухие фекалии и мочу зараженных животных;
- при уходе за больными животными, обработке сырья животного происхождения;
- при употреблении инфицированного молока или молочных продуктов

Возбудители лихорадки Ку в большом количестве выделяются с молоком, околоплодной жидкостью, экскрементами животных, инфицируя шерсть животных, среду их обитания.



Симптомы

- высокая температура тела,
- слабость,
- потливость или озноб,
- головная боль, боль в мышцах,
- кашель, боль в груди.

При своевременном обращении к врачу и лечении лихорадка Ку заканчивается полным выздоровлением.

Вакцинация людей рекомендована для контингентов, имеющих высокий риск инфицирования в связи с профессиональной деятельностью.

