

При посещении эндемичных стран соблюдайте меры профилактики мелиоидоза:

- избегайте контакта с почвой: не ходите босиком, используйте закрытую обувь, отдыхайте на шезлонгах или постеленном коврик, царапины и мозоли обязательно закрывайте пластырем;
- не купайтесь в пресных водоемах, особенно стоячих или медленнотекущих;
- избегайте поездок в районы с возможными наводнениями, а также исключите контакты с животными;
- употребляйте только доброкачественные продукты и воду;
- соблюдайте правила личной гигиены.

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиенического
образования населения»
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер.,
д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28



Мелиоидоз

Мелиоидоз

Особо опасная инфекция, эндемичная для тропических стран.

Где распространен?

Страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.

В России регистрировались завозные случаи мелиоидоза из Таиланда в 2017, 2024 и 2026 годах.

Возбудитель мелиоидоза – бактерия *Burkholderia pseudomallei*, естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира.



Пути передачи

- почва и вода, загрязненные *B. pseudomallei*;
- больной человек и животные (практически все позвоночные);
- растения, колонизированные *B. pseudomallei*

Как происходит заражение

- при контакте поврежденной кожи, слизистых оболочек с зараженной почвой и водой;
- при употреблении зараженной пищи или воды;
- при попадании возбудителя в организм с воздухом



Симптомы

- высокая температура,
- боли в мышцах, грудной клетке,
- кашель с гнойной мокротой и примесью крови,
- диарея,
- абсцессы различной локализации.

При множественных абсцессах летальность может достигать 95%.

Болезнь может развиваться после многолетнего латентного периода!

