

Неспецифическая профилактика

Защита от насекомых и клещей:

- носить закрытую одежду,
- использовать специальные средства от насекомых и клещей для обработки одежды и тела,
- использовать специальные защитные сетки для окон и дверей,
- использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях.

Перед использованием средств от насекомых и клещей необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению!

Не создавать благоприятные условия для выплода комаров во дворах и на дачных участках: не создавать ландшафтные объекты со стоячей водой.

Избегать нахождения в заболоченных местах.

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиенического образования населения»
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер.,
д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



Лихорадка Западного Нила



Лихорадка Западного Нила

относится к группе заболеваний, общих для человека и животных, с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя.

Источник инфекции


дикие и синантропные птицы.

С эпидемиологической точки зрения человек - конечное звено в цепи распространения лихорадки Западного Нила.

Как передается

при укусах различных видов комаров, аргасовых и иксодовых клещей.

Возможна передача инфекции при переливании крови, трансплантации органов, через материнское молоко или при работе с вирусом в лаборатории.



Где встречается

Сегодня природные очаги этой инфекции зарегистрированы более чем в 90 странах на территории Африки, Америки, Европы и Азии.

В России эндемичными территориями считаются южные регионы.

Однако в связи с потеплением климата зона распространения лихорадки Западного Нила существенно расширяется.

Случаи местного заражения регистрируются в Центральной части России и Поволжье.

Собираясь в поездку, полезно заранее изучить сведения об эпидемиологической обстановке и подумать о необходимых мерах профилактики.

Симптомы

В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно.

Реже развивается гриппоподобная форма, для которой характерны симптомы:

- повышение температуры тела
- общая слабость
- интенсивная головная боль,
- боль в глазных яблоках
- боль в мышцах и суставах.

В 1% случаев развиваются тяжелые нейроинвазивные формы заболевания, для которых характерны симптомы:

- рвота
- головная боль
- ригидность мышц шеи
- заторможенность
- дезориентация
- тремор и судороги
- мышечная слабость

Менингоэнцефалит — наиболее тяжелая форма заболевания, летальность при ней близка к 50%.

