

Туляремия



Туляремия – природно-очаговая инфекция, широко распространенная на территории России, вызываемая бактериями *Francisella tularensis*.



Грызуны – основной источник возбудителя инфекции



Существование микроба в природных очагах поддерживается также иксодовыми клещами, комарами, слепнями.

Инкубационный период

в среднем 3-7 дней



Симптомы

повышение температуры, головная боль, слабость, воспаление лимфоузлов и прилежащих к ним тканей

Как происходит заражение

- при укусе инфицированными кровососущими насекомыми (**комары, слепни**), присасывании **клещей**;
- при соприкосновении с **больными животными** или их тушками;
- при употреблении **продуктов питания и воды** (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов), загрязненных возбудителем туляремии от больных грызунов;
- при вдыхании воздушно-пылевого **аэрозоля**, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, загрязненных возбудителем туляремии от больных грызунов.

Установлено отсутствие передачи инфекции от человека к человеку.

Профилактика туляремии на эндемичных территориях:

- борьба с **грызунами** – источниками возбудителя;
- борьба с **клещами, комарами, слепнями** – переносчиками возбудителя;
- хранение продуктов в местах, недоступных для грызунов, воды – в закрытых емкостях;
- отказ от употребления продуктов со следами жизнедеятельности грызунов;
- использование средств индивидуальной защиты (маски или респираторы, перчатки) при проведении "пыльных" сельскохозяйственных работ.

Населению, проживающему на неблагополучных по туляремии территориях, а также лицам, подвергающимся риску заражения этой инфекцией, проводится **вакцинация** против туляремии.