

# Филяриозы



Филяриозы – группа тропических гельминтозов, вызываемых паразитическими червями – филяриями.

Филяриозы распространены преимущественно в жарких странах: на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии.

В России возможно выявление только завозных случаев заболевания.

Заражение человека происходит при укусах инфицированных филяриями кровососущих насекомых (через комаров рода *Culex*, *Aedes*, *Mansonia*, *Anopheles*, мошек семейства *Simuliidae*, слепней рода *Chrysops*).

Филяриозы опасны риском развития тяжелых осложнений вплоть до инвалидизации. Возможно развитие слоновости различных частей тела, чаще нижних конечностей, абсцессов плевральной и брюшной полостей, атрофии кожи, необратимой слепоты.

## Меры профилактики при посещении тропических стран:

- использование специальных видов одежды, препятствующих проникновению насекомых к телу человека (антимоскитных костюмов, комбинезонов, защитных головных уборов, напульсников на рукавах и брюках – для наибольшего прилегания одежды),
- применение репеллентов на открытых участках тела,
- засетчивание окон и дверей,
- использование антимоскитного надкроватного полога.



## Филяриозы бывают:

- **лимфатические** (вухерериоз, бругиоз) – характерно поражение лимфатической системы,
- **соединительнотканнные** (онхоцеркоз, лоаоз) – характеризуются поражением кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов, органов зрения.

**Симптомы** зависят от типа возбудителя и локализации паразитов. Наиболее часто отмечаются лихорадка, увеличение и болезненность лимфатических узлов, зудящие кожные высыпания, возможны зрительные нарушения (затуманивание, "мушки").