


Меры профилактики

- исключение из пищевого рациона сырого и недостаточно термически обработанного мяса крупного рогатого скота;
- приобретение мяса только в местах санкционированной торговли.

Профилактику осуществляют с помощью комплекса медицинских и ветеринарных мероприятий, направленных на выявление источников инвазии при массовом обследовании населения. Проводят мероприятия по защите окружающей среды (пастбищ) от фекального загрязнения.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28



Тениаринхоз



Подготовлено на основании материалов
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора

Подготовлено на основании материалов
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора

Тениаринхоз

биогельминтоз с хроническим течением, вызываемый бычьим цепнем, характеризующийся преимущественно желудочно-кишечными расстройствами.

Кто может заболеть?

Тениаринхозом болеют люди всех возрастов, употребляющие в пищу недостаточно термически обработанное мясо: говядину, говяжий фарш, стrogанину из мяса крупного рогатого скота.

Источник инвазии

больной тениаринхозом человек, который с фекалиями выделяет в окружающую среду яйца гельминта. Это приводит к заражению промежуточных хозяев (крупного рогатого скота).



Где распространен?

Высокий уровень пораженности тениаринхозом отмечается практически во всех странах Азии, Африки, Южной и Центральной Америки. В России превышение среднероссийского показателя заболеваемости фиксируется в регионах с широким распространением пастбищного и отгонного содержания животных.

Симптомы

Нередко протекает бессимптомно и проявляется только выделением фрагментов гельминта из заднего прохода с фекалиями или вне акта дефекации.

При длительной инвазии возможны общая слабость, боли в животе, иногда снижение массы тела, диарея, повышение аппетита, головокружение, головная боль, нарушение сна, обмороки, судороги.

Осложнения

возникают очень редко, к ним относятся:

- механическая кишечная непроходимость,
- аппендицит,
- холангит,
- панкреатит

Продолжительность жизни бычьего цепня в кишечнике человека – до 20 лет.

