Вакцинация

позволяет избежать более 90% случаев инфицирования Hib-инфекцией.

Плановая вакцинация детей против гемофильной инфекции типа b проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по схеме:

- **V1 – в 3 месяца**
- **V2 – в 4,5 месяца**
- **V3 – в 6 месяцев**
- **RV – в 18 месяцев**

Вакцину против Hib-инфекции можно вводить одновременно с другими вакцинами, входящими в национальный календарь (кроме БЦЖ).

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru,
тел.: 8 (499) 241 86 28



Гемофильная инфекция типа b

Hib-инфекция



http://cgon.rospotrebnadzor.ru/

Гемофильная инфекция

заболевание, вызываемое гемофильной палочкой *(Haemophilus influenzae),* которая поражает преимущественно органы дыхания и оболочки мозга.

В зависимости от типа возбудителя течение инфекции варьирует от легкого до опасного для жизни.

Гемофильная палочка типа b (Hib) вызывает наиболее тяжелые формы заболевания, которые могут стать причиной летального исхода:

- эпиглоттит (воспаление надгортанника)
- пневмонию,
- сепсис,
- менингит.

Путь передачи
воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре.

Источник инфекции
человек, больной любой формой Hib-инфекции, или бактерионоситель.

Формы инфекции

- **бессимптомное носительство,**
- **локализованные формы:** острый ринит, отит, синусит,
- **генерализованные формы:** эпиглоттит, пневмония, сепсис, менингит.

Симптомы

При легком течении симптомы схожи с ОРВИ – заложенность носа, боли в горле, конъюнктивит и др.

При тяжелом течении симптомы будут зависеть от локализации возбудителя.

При менингите
лихорадка, головная боль, светобоязнь, ригидность затылочных мышц, тошнота, рвота.

При пневмонии
лихорадка, озноб, головная боль, слабость, обильное потоотделение, кашель, затрудненное дыхание, боль в груди.

При эпиглоттите
лихорадка, слюнотечение, озноб.

При сепсисе
лихорадка, геморрагическая сыпь.

Осложнения

При гемофильной инфекции высок риск развития необратимых неврологических осложнений.

К ним относятся расстройство речи, умственная отсталость, нейросенсорная тугоухость.

Гемофильная инфекция может привести к летальному исходу.

Даже при самых современных методах лечения летальность при гемофильном менингите не бывает ниже 5%, а при гемофильном эпиглоттите достигает 10%.

Наиболее опасна гемофильная инфекция для детей до 5 лет.

Вероятность заражения детей до 5 лет в 6 тысяч раз выше, чем в других возрастных группах.

