

Стронгилоидоз



Стронгилоидоз – это гельминтоз с фекально-оральным и перкутаным (чрескожным) механизмами передачи возбудителя.

Возбудитель заболевания — гельминт *Strongyloides stercoralis*.

Стронгилоидоз эндемичен для влажных тропических и субтропических регионов.

Как передается:

- при соприкосновении с зараженной почвой в результате активного проникновения личинок через кожу (наиболее частый),
- при употреблении овощей и фруктов, загрязненных личинками гельминта,
- при питье воды из загрязненных источников водоснабжения.

Симптомы проявляются лишь у небольшой части зараженных лиц; в остальных случаях заболевание протекает бессимптомно.

В случае возникновения клинических проявлений характерными для стронгилоидоза являются кожный синдром, симптомы желудочно-кишечных расстройств и поражения органов дыхания.

Кожный синдром связан с миграцией личинок. На коже появляются зудящие волдыри, которые «ползут» по коже со скоростью 5-15 см в час, образуя линейные высыпания.

Симптомы желудочно-кишечных расстройств – боль в эпигастральной области, рвота.

Симптомы поражения органов дыхания – кашель, одышка.

Профилактика:



- исключение ходьбы босиком и других контактов открытых участков тела с почвой на эндемичных территориях,
- тщательное мытье овощей, ягод и зелени перед употреблением,
- мытье рук после контакта с почвой, посещения туалета, перед едой.