

Меры профилактики

- Раннее выявление и лечение больных стронгилоидозом лиц.
- Охрана окружающей среды от фекального загрязнения.
- Исключение ходьбы босиком и других контактов открытых участков тела с почвой на эндемичных территориях.
- Тщательное мытье овощей, ягод и зелени перед употреблением.
- Соблюдение правил личной гигиены (прежде всего – тщательное мытье рук после контакта с почвой, посещения туалета, перед едой).



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



Стронгилоидоз



<http://cgon.rosпотребнадзор.ru/>



<http://cgon.rosпотребнадзор.ru/>

Стронгилоидоз

это гельминтоз с фекально-оральным и чрескожным механизмами передачи возбудителя; характеризуется, с одной стороны, способностью длительного бессимптомного течения, а с другой – возможностью летального исхода у людей со сниженным иммунитетом.

Возбудитель

гельминт *Strongyloides stercoralis* (кишечная угрица)

Распространенность

Эндемичен для влажных тропических и субтропических регионов.

По оценкам ВОЗ в мире инфицировано от 30 до 100 миллионов человек




Как происходит заражение?

- при ходьбе босиком, соприкосновении с зараженной почвой в результате активного проникновения личинок через кожу (наиболее часто);
- при употреблении овощей и фруктов, загрязненных личинками гельминта;
- при питье воды из загрязненных источников водоснабжения.

Симптомы заболевания проявляются лишь у небольшой части зараженных лиц.

В остальных случаях заболевание протекает, как правило, бессимптомно.



Симптомы

В случае возникновения клинических проявлений характерными для стронгилоидоза являются кожный синдром, симптомы желудочно-кишечных расстройств и поражения органов дыхания.

Кожный синдром связан с миграцией личинок. На коже появляются зудящие волдыри, которые «ползут» по коже со скоростью 5-15 см в час, образуя линейные высыпания.

Симптомы желудочно-кишечных расстройств – боль в эпигастральной области, рвота.

Симптомы поражения органов дыхания – кашель, одышка.

