

## Меры профилактики

При посещении тропических стран необходимо применение средств защиты от укусов кровососущих насекомых:

- использование специальных видов одежды, препятствующих проникновению насекомых к телу человека (антимоскитных костюмов, комбинезонов, защитных головных уборов, напульсников на рукавах и брюках – для наибольшего прилегания одежды)
- применение репеллентов и инсектицидов
- засетчивание окон и дверей
- использование антимоскитного надкроватного полога



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиенического образования населения»  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1  
e-mail: [cgon@cgon.ru](mailto:cgon@cgon.ru)  
тел.: 8 (499) 241 86 28



# ФИЛЯРИОЗЫ



## Филяриозы

группа тропических трансмиссивных гельминтозов, вызываемых паразитическими червями – филяриями

## Где распространены

преимущественно в странах с тропическим и субтропическим климатом: на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии

**В России возможно выявление только завозных случаев заболевания**

## Различают филяриозы

- лимфатические (вухерериоз и бругиоз), для которых характерно поражение лимфатической системы
- соединительнотканые (онхоцеркоз и лоаоз), характеризующиеся поражением кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов и органов зрения

## Источник инфекции

больной человек

## Человек заражается

трансмиссивным путем при укусах инфицированных филяриями кровососущих насекомых:

- комаров рода *Culex*, *Aedes*, *Mansonia*, *Anopheles*
- мошек семейства *Simuliidae*
- слепней рода *Chrysops*

**Симптомы зависят от типа возбудителя и локализации паразита**

## Наиболее частые клинические проявления

- лихорадка
- отеки
- увеличение и болезненность лимфатических узлов
- зудящие высыпания на коже
- слезотечение, зуд в области век, зрительные нарушения (затуманивание, “мушки”)

**Филяриозы опасны риском развития тяжелых осложнений вплоть до инвалидизации**

## Возможные осложнения

- слоновость различных частей тела, чаще нижних конечностей
- абсцессы подкожной клетчатки, мышц, половых органов, полостей суставов, плевральной и брюшной полостей
- атрофия кожи
- необратимая слепота
- менингоэнцефалит

**Для предотвращения развития осложнений при появлении симптомов заболевания не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу!**

