


Меры профилактики

- Исключение ходьбы босиком и других контактов открытых участков тела с почвой на эндемичных территориях.
- Тщательное мытье овощей, ягод и зелени перед употреблением.
- Соблюдение правил личной гигиены (тщательное мытье рук после контакта с почвой, перед едой).
- Раннее выявление и лечение больных лиц.
- Охрана окружающей среды от фекального загрязнения.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28



Анкилостомидозы



Подготовлено на основании материалов
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора

Подготовлено на основании материалов
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора

Анкилостомидозы

Гельминтозы с фекально-оральным и контактным механизмами передачи, характеризующиеся хроническим течением, поражением пищеварительного тракта и развитием анемии.

Где распространены?

На территориях с тропическим и субтропическим климатом – преимущественно в странах Азии, Центральной Америки, юга Африки, на островах Тихого океана, на Кавказе, в Средней Азии.

Число пораженных в мире превышает 900 млн человек.



Пути передачи

- контактный – проникновение личинок в организм человека через неповрежденную кожу, реализуется при соприкосновении с почвой, например, при ходьбе босиком (преимущественно при некасторозе);
- пищевой и водный – заглатывание возбудителя, реализуется при употреблении загрязненных пищи и воды.

Наибольшему риску заражения подвержены лица, занятые на земляных и сельскохозяйственных работах, работники чайных и кофейных плантаций, шахтеры, дети.



Симптомы

- сыпь, отек, покраснение кожи на месте внедрения паразита, сухой кашель, повышение температуры тела (при контактном заражении через кожу);
- боли в животе, диарея, снижение аппетита, тошнота;
- симптомы анемии: бледность кожных покровов, повышенная утомляемость, слабость, одышка, снижение выносливости к продолжительной тяжелой работе и физическим нагрузкам, задержка умственного и физического развития детей.

