

Желтая лихорадка



Желтая лихорадка – острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой тела, поражением печени и почек, распространенное в основном в Африке и Южной Америке.

Передается через укусы комаров видов *Aedes* и *Haemagogus*.

Источник инфекции – больной человек и обезьяны. В отсутствие переносчиков больной человек не представляет опасности для окружающих.

Симптомы: повышенная температура, мышечная боль с сильной болью в спине, головная боль, потеря аппетита и тошнота или рвота, проходящие через 3-4 дня.

Иногда в течение 24 часов после исчезновения симптомов наступает вторая, более тяжелая фаза заболевания.

Она сопровождается повышением температуры тела до 40°C, развитием геморрагического синдрома, почечной и печеночной недостаточности.

Опасность желтой лихорадки заключается в том, что она **может быть смертельной**: у небольшой доли пациентов, инфицированных вирусом, развиваются тяжелые симптомы, около половины из них умирает в течение 7-10 дней.

Туристам не менее чем за 10 дней до въезда в эндемичную страну необходимо пройти вакцинацию от желтой лихорадки.

Какие страны только рекомендуют проведение прививки перед въездом, а какие обязательно требуют иметь международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки?

Узнайте, перейдя по коду



Меры профилактики желтой лихорадки

Туристам, выезжающим в страны, эндемичные по желтой лихорадке, необходимо сделать прививку и соблюдать меры защиты от укусов комаров:

- носить закрытую одежду,
- использовать репелленты,
- использовать специальные защитные сетки для окон и дверей,
- использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях.