ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора

Менингококковая инфекция


молниеносный убийца



Менингококковая инфекция

- острая бактериальная инфекция с различными клиническими проявлениями: от насморка до менингита или сепсиса

- может протекать молниеносно и привести к летальному исходу в течение 24 часов




никакая другая инфекция не убивает так быстро, как менингококковая

Менингококковая инфекция

кто рискует больше?

- дети до 5 лет
- подростки в возрасте 13-17 лет
- лица старше 60 лет
- лица с иммунодефицитами
- лица, проживающие в общежитиях
- лица, выезжающие в эндемичные районы
- лица, принимающие участие в массовых международных мероприятиях



заболеваемость среди детей до 5 лет в 25 раз выше, чем среди взрослых

Менингококковая инфекция


как происходит заражение?

Источник инфекции

- больной любой формой инфекции
- бессимптомные носители

Путь передачи

- воздушно-капельный
- при тесном общении, когда расстояние между людьми составляет менее 1 метра



носительство менингококка среди взрослых может достигать 11%, а среди подростков – 25%

Менингококковая инфекция

формы инфекции

назофарингит
- боль в горле
- насморк
- кашель

менингит
- высокая температура
- головная боль
- рвота
- светобоязнь
- ригидность мышц шеи

сепсис
- высокая температура
- характерная сыпь



возможно молниеносное течение, когда счет идет буквально на минуты!

Осложнения

всегда тяжелые

- пневмония
- кровоизлияния во внутренние органы
- гидроцефалия
- глухота
- парезы
- ампутации пальцев и конечностей



летальность при тяжелых формах менингококковой инфекции может достигать 30%, а инвалидизация наступает в 10-15% случаев

Менингококковая инфекция

вакцинация

Вакцинация против менингококковой инфекции проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям




вакцинопрофилактика – самая эффективная мера профилактики менингококковой инфекции

Вакцинация

по эпидемическим показаниям

Вакцинация проводится:

- детям и взрослым в очагах менингококковой инфекции
- лицам, проживающим в эндемичных регионах
- лицам, подлежащим призыву на военную службу
- в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С



детям с 9 до 23 месяцев вакцинация проводится двукратно с интервалом не менее 3 месяцев, детям с 2-х лет и взрослым — однократно

ВсемСанПросвет

присоединяйтесь

Телеграм

Вконтакте

Rutube

Макс

