


Лихорадка Ку (коксииеллез)



Лихорадка Ку (коксииеллез) – инфекционная болезнь, передающаяся человеку от животных, вызываемая бактерией *Coxiella burnetii*.

В сельскохозяйственных (антропургических) очагах основным источником инфекции является мелкий и крупный рогатый скот.



В природных очагах резервуаром возбудителя инфекции являются клещи, мелкие млекопитающие, птицы.

Возбудители лихорадки Ку в большом количестве выделяются с молоком, околоплодной жидкостью, экскрементами животных, инфицируя шерсть животных, среду их обитания.

Как передается:

- при вдыхании пыли, содержащей сухие фекалии и мочу зараженных животных,
- при уходе за больными животными, обработке сырья животного происхождения,
- при употреблении инфицированного молока или молочных продуктов.

Инкубационный период:

в среднем 1-2 недели.

Симптомы:

- высокая температура тела,
- слабость,
- потливость или озноб,
- головная боль, боль в мышцах,
- кашель, боль в груди.

Профилактика лихорадки Ку:

- употребляйте только термически обработанные молоко и молочные продукты;
- приобретайте продукты только в местах санкционированной торговли;
- соблюдайте меры предосторожности при работе с сельскохозяйственными животными: используйте маску, перчатки и защитную одежду;
- после работы с сельскохозяйственными животными примите душ и переодевайтесь.

При своевременном обращении к врачу и вовремя начатом лечении лихорадка Ку заканчивается полным выздоровлением.