Неспецифическая профилактика

- соблюдение правил личной гигиены,
- мытье рук с мылом,
- поддержание здорового образа жизни,
- регулярное проветривание помещений,
- исключение контактов с заболевшими любой инфекцией

При возникновении инфекции

- исключить общение с другими членами семьи или коллектива,
- не заниматься самолечением,
- при первых симптомах обратиться в медицинскую организацию,
- соблюдать все назначения врача.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ





http://cgon.rospotrebnadzor.ru/

Пневмококковая инфекция

группа инфекционных заболеваний, вызываемых *Streptococcus pneumoniae*, или пневмококком.

Пневмококк может поражать практически все органы, вызывая отиты, синуситы, конъюнктивиты, бронхиты.

Наиболее опасные формы инфекции, которые могут привести к летальному исходу:

- пневмония,
- сепсис,
- менингит.

Источник инфекции
больной любой формой пневмококковой инфекции или бактерионоситель.

Путь передачи
воздушно-капельный во время кашля, чихания, при разговоре.

Группы риска

- дети до 2-х лет,
- дети, посещающие организованные коллективы,
- пожилые люди,
- люди с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Симптомы

Начальные симптомы могут быть общими для всех форм инфекции: внезапный подъем температуры, озноб, кашель, одышка.

При пневмонии к симптомам присоединяются одышка, боль в груди, кашель с трудноотделяемой «ржавой» мокротой.

При менингите – сильнейшая головная боль, спутанность сознания, тошнота, светобоязнь.

У пожилых людей симптомы могут быть менее специфичными.

Вакцинация

Плановая вакцинация детей проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по схеме:

- **V1 – в 2 месяца,**
- **V2 – в 4,5 месяца,**
- **RV – в 15 месяцев.**

По эпидемическим показаниям вакцина против пневмококковой инфекции вводится:

- детям в возрасте от 2 до 5 лет,
- призывникам,
- лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких,
- лицам старше трудоспособного возраста, проживающим в организациях социального обслуживания.

