

Вакцинация против клещевого энцефалита

Это самый эффективный способ профилактики.

Нужна лицам, планирующим посещение эндемичных территорий.

Вакцинация проводится по схеме:

V1 — в выбранный день,
V2 — через 1-5 месяцев,
RV — через 12 месяцев,
далее RV — каждые 3-5 лет.

Для выработки иммунитета требуется не менее двух недель, поэтому завершить курс вакцинации (две прививки) против клещевого энцефалита необходимо не позднее, чем за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



Профилактика клещевого вирусного энцефалита



Клещевой вирусный энцефалит

Инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, которое может привести к летальным исходам и стойкой инвалидизации.

Как заражается человек?

Чаще всего - при присасывании клеща, зараженного вирусом клещевого энцефалита.

Эндемичные территории

Регионы, где распространены клещи, зараженные вирусом клещевого энцефалита. Находясь там, следует соблюдать меры предосторожности.



Как предотвратить присасывание клеща

Правильно одеться:

- однотонная светлая одежда,
- прилегающие манжеты и воротник,
- брюки заправить в сапоги или носки,
- верхнюю часть одежды заправить в брюки,
- волосы заправить под капюшон, шапку или косынку.

Проводить само- и взаимоосмотры

При пребывании в лесу - каждые 15-20 минут.

Обрабатывать одежду специальными аэрозольными средствами:

- акарицидными,
- репеллентными,
- акарицидно-репеллентными.

Использовать специальные средства только в соответствии с инструкцией!

Что делать, если обнаружили на себе клеща?

- Присосавшегося клеща немедленно удалить.
- Продезинфицировать ранку антисептиком.
- Доставить клеща в лабораторию для выполнения исследования на наличие возбудителей инфекций.



Как удалить клеща?

Используя специальные приспособления: клещеверт, ручку-лассо.

При помощи подручных средств: нитки, пинцета или ногтями.

Любым из способов захватить клеща как можно ближе к коже за хоботок, повернуть вокруг своей оси на 360° и потянуть вверх.

