

Клещевой вирусный энцефалит



Клещевой вирусный энцефалит – это природно-очаговое заболевание, передающееся клещами и характеризующееся преимущественным поражением центральной нервной системы.

Возбудитель – вирус клещевого энцефалита. **Переносчики** – клещи рода *Ixodes*.

Естественные хозяева – крупный рогатый скот, овцы, собаки, птицы, грызуны.

Пути передачи:

- трансмиссивный – при присасывании иксодовых клещей,
- пищевой – при употреблении молока зараженных коз и коров.

Симптомы:

- повышение температуры тела,
- сильная головная боль,
- тошнота и рвота,
- боль в мышцах и суставах.

При тяжелом течении появляются симптомы поражения ЦНС:

- ригидность мышц шеи,
- спутанность сознания,
- судороги, парезы и параличи.

Вакцинация – эффективная мера профилактики клещевого вирусного энцефалита!

Вакцинация проводится по схеме:

- V 1 — в выбранный день,
- V 2 — через 1-7 месяцев,
- RV — через 12 месяцев,
- далее RV — каждые 3-5 лет.

Вакцинация показана лицам, проживающим в эндемичных регионах или планирующим их посещение.



Собираясь на прогулку, в лес, на дачу, **соблюдайте простые правила:**

- Надевайте дышащую однотонную одежду нейтрального цвета – рубашки с длинными рукавами и брюки. Брюки заправьте в носки, на рукава наденьте резинки. Голову закройте головным убором.
- Используйте специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией.
- Ходите по тропам, избегайте высокой травы и кустарников.
- Если садитесь на землю, используйте брезент или специальные туристические коврики.
- Осматривайте себя и спутников на наличие клещей каждые 15-20 минут.

В случае присасывания клеща:

- Клеща немедленно удалить.
- Ранку обработать антисептиком.
- Клеща поместить в емкость и доставить в лабораторию для исследования на наличие возбудителей инфекций.
- При положительном результате обратиться в медицинскую организацию.