

Крымская геморрагическая лихорадка



Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) — вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание, возбудитель которого передается клещами. Для КГЛ характерно острое течение с выраженной интоксикацией, подъемом температуры тела до 39-41°C и геморрагическим синдромом, высокий уровень летальности.

Возбудитель — вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки. **Переносчики** — клещи *Hyalomma marginatum*. **Источники инфекции** — крупный и мелкий рогатый скот, косули, волки, зайцы, ежи, грачи, вороны, сороки, куропатки, индейки.

В организм человека возбудитель чаще всего попадает со слюной клеща при его присасывании — это **трансмиссивный механизм** передачи возбудителя инфекции.

Также возможно заражение при раздавливании клеща, забое инфицированных животных и разделке туш, уходе за больными в случае контакта с кровью.

Где встречается?



Степные, полупустынные и лесостепные ландшафты юга России: Республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области.



Для снижения риска инфицирования на неблагополучных по КГЛ территориях следует соблюдать меры профилактики:

- Надевать на прогулку, рыбалку, сельскохозяйственные работы однотонную одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон.
- Убедиться, что все элементы одежды (рукава, брюки и носки) плотно прилегают к телу и полностью его закрывают.
- Использовать специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией.
- Проводить само- и взаимоосмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15-20 минут.
- Не заносить в помещение свежесорванные травы, ветки, другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
- Осматривать домашних животных для обнаружения клещей.
- В случае обнаружения клеща следует немедленно удалить его. Это можно сделать специальными приспособлениями (клещевёрт и др.), которые продаются в аптеках. При их отсутствии, захватив клеща любым способом (пинцетом, ниткой, пальцами и т.д.), нужно повернуть его вокруг своей оси на 360° и потянуть вверх.
- При удалении клещей необходимо использовать защитные перчатки, так как возможно заражение КГЛ при раздавливании клеща.

