
Пневмококковая инфекция

Пневмококковая инфекция — инфекционное заболевание человека, вызываемое бактерией *Streptococcus pneumoniae,* или пневмококком. Эта бактерия может поражать практически все органы, вызывая отиты, синуситы, конъюнктивиты, бронхит, пневмонию, менингит, сепсис.

Симптомы пневмококковой инфекции зависят от локализации возбудителя. Начальные симптомы могут быть общими для всех форм инфекции: внезапный подъем температуры, озноб, кашель, одышка.

Путь передачи – воздушно-капельный (при разговоре, кашле и чихании).



Дети первых лет жизни – главные источники пневмококковой инфекции.

Восприимчивость к пневмококковой инфекции всеобщая, но наиболее часто от нее страдают дети младше двух лет и пожилые люди с хроническими заболеваниями легких.

Пневмококк – основная причина пневмоний у детей до 5 лет и у взрослых старше 65 лет.

Вакцинация — надежная защита от пневмококковой инфекции!

Вакцинация детей до 2 лет проводится согласно национальному календарю профилактических прививок по схеме:

- **первая прививка в 2 месяца**
- **вторая – в 4,5 месяца**
- **ревакцинация – в 15 месяцев**

Если прививку не сделали в первые 6 месяцев жизни, то вакцинация проводится двукратно с интервалом между прививками не менее 2 месяцев.

Вакцинации по эпидемическим показаниям подлежат:

- **дети в возрасте от 2 до 5 лет,**
- **призывники,**
- **лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких,**
- **лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания.**

Неспецифическая профилактика пневмококковой инфекции

- **соблюдайте правила личной гигиены, мойте руки с мылом**
- **используйте маски в общественных местах**
- **придерживайтесь принципов здорового образа жизни**
- **исключайте контакты с заболевшими любой инфекцией**

cgon.rospotrebnadzor.ru