

Меры профилактики

- исключение из пищевого рациона сырой и недостаточно термически обработанной свинины, а также мяса, не прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу;
- приобретение свинины только в местах санкционированной торговли.

Профилактические мероприятия включают выявление и лечение всех больных тениозом, обеспечение санитарного надзора за содержанием и убоем свиней, ветеринарную экспертизу мяса с утилизацией зараженного, предупреждение загрязнения почвы и воды фекалиями человека.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28



Тениоз



Подготовлено на основании материалов
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора



Подготовлено на основании материалов
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора

Тениоз

биогельминтоз, вызываемый паразитированием в тонком кишечнике человека свиного цепня и проявляющийся нарушением функций желудочно-кишечного тракта.

Кто может заболеть?

Тениозом болеют люди всех возрастов, употребляющие в пищу недостаточно термически обработанное мясо – свинину, свиной фарш, строганину из свиного мяса.

Источник инвазии

человек, который, будучи поражен тениозом, вместе с фекалиями выделяет в окружающую среду онкосфера. Это приводит к заражению промежуточных хозяев (свиней) финнозом.



Где распространен?

Тениоз регистрируют в странах, где развито свиноводство. В настоящее время на территории России отмечаются лишь спорадические случаи заболеваний тениозом.

Помимо свиней, промежуточными хозяевами тениоза могут служить дикий кабан, медведь, верблюд. Реже - собака, кошка, кролик, заяц.

Симптомы

Умеренно выраженные диспепсические расстройства и общетоксические проявления:

- нарушение аппетита,
- тошнота, рвота, боли в животе, неустойчивый стул,
- периодические головные боли, головокружение, обморочные состояния,
- нарушение сна.

Осложнения

- кишечная непроходимость,
- перфорация кишки,
- аппендицит,
- холангит,
- панкреатит,
- аутоинвазия с развитием цистицеркоза

Продолжительность жизни свиного цепня в кишечнике человека – несколько лет.

