

Меры профилактики

- Используйте для питья бутилированную или кипяченую воду.
- Для хозяйственно-бытовых нужд применяйте воду из безопасных источников.
- Воздерживайтесь от употребления льда, изготовленного из воды неизвестного происхождения.
- Употребляйте в пищу тщательно вымытые фрукты, ягоды, овощи и зелень.
- При появлении признаков инфекционного заболевания не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.

Важно своевременно выявлять и лечить зараженных фасциозом сельскохозяйственных животных.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



Фасциоз



Фасциолез

зоонозный биогельминтоз из группы трематодозов с фекально-оральным механизмом передачи, хроническим течением и преимущественным поражением желчевыделительной системы.

Возбудитель

Fasciola hepatica — двуустка печеночная и *Fasciola gigantica* — двуустка гигантская.

Распространенность

Единичные случаи заражения регистрируются во многих странах мира. Наиболее широко распространен фасциолез в странах Азии, Африки и Южной Америки.



Жизненный цикл

Развитие паразитов происходит со сменой двух хозяев:

- промежуточный — моллюск,
- окончательный — травоядные животные (мелкий и крупный рогатый скот, свиньи, лошади), иногда человек.

Пути передачи — пищевой и водный.

Заражение происходит при

- употреблении воды из небезопасных источников,
- овощей и зелени, особенно тех, что растут вблизи водоемов или орошаются зараженной водой.



Симптомы

- Острая стадия: повышение температуры тела, недомогание, снижение аппетита, боль в животе или правом подреберье, тошнота, рвота, высыпания на коже, возможна желтуха.
- Хроническая стадия: боль в правом подреберье, диспептические явления.

Симптомы фасциолеза появляются через 1-8 недель после попадания паразита в организм человека с водой или пищей.

