

Вакцинация — надежная защита от эпидемического паротита!

Плановая вакцинация детей против эпидемического паротита проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по схеме:

- вакцинация – в 12 месяцев,
- ревакцинация – в 6 лет.

Вакцинация по эпидемическим показаниям*

Экстренная вакцинация в очаге проводится в течение 7 дней с момента выявления первого больного всем контактным:

- непривитым,
- не болевшим ранее,
- привитым однократно,
- не имеющим сведений о вакцинации.

**В соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям*

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28



Эпидемический паротит



Эпидемический паротит

острая вирусная инфекция, характеризующаяся поражением слюнных желез и других железистых органов, а также центральной нервной системы.

Источник инфекции

больной человек, в том числе стертой или бессимптомной формой эпидемического паротита.

Больной человек

становится заразным за несколько дней до появления симптомов.

Пути передачи

- воздушно-капельный — вирус выделяется со слюной,
- контактно-бытовой — через полотенца, игрушки и другие инфицированные предметы.

Заражение происходит при тесном и продолжительном контакте с больным человеком.

Симптомы

Болезнь начинается остро с озноба, повышения температуры тела до 39-40°C.

К концу первых дней болезни появляется болезненная припухлость околоушной железы с одной стороны, через 1-2 дня поражается и вторая железа.

Воспаление слюнных желез сопровождается сухостью во рту, жаждой, болью в области уха, усиливающейся при жевании и разговоре.

При поражении других симптомы будут зависеть от локализации процесса:

- **поджелудочная железа**
тошнота и рвота, опоясывающие боли в верхней части живота,
- **половые железы**
у мужчин — боли в паху, увеличение пораженного яичка,
у женщин — боли в нижней части живота,
- **нервная система**
головная боль, ригидность мышц шеи, спутанность сознания, судороги, парезы.

Осложнения

Прогноз при эпидемическом паротите в большинстве случаев благоприятный.

В редких случаях могут развиваться осложнения — бесплодие, сахарный диабет, хронический панкреатит, глухота, артрит, перикардит и другие патологические состояния.

Ряд экспертов считает, что до 50% всех случаев бесплодия являются следствием перенесенного в детстве эпидемического паротита!

Заболевание эпидемическим паротитом в I триместре беременности может привести к внутриутробному инфицированию плода и самопроизвольному выкидышу.

